

Key Things to Know About COVID-19 Vaccines for Parents and Guardians

- 01** Although fewer children have been infected with COVID-19 compared to adults, children can be infected with the virus that causes COVID-19, can get sick from COVID-19, and can spread COVID-19 to others. CDC recommends COVID-19 vaccination for everyone 12 years of age and older to help protect against COVID-19. **Children 12 years of age and older are able to get the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine.**
- 02** Your child may have side effects after vaccination, but these are normal and a good sign that the body is building protection!
 - Common side effects include:
 - Pain, redness or swelling in the arm where you got the shot
 - Tiredness, headache, muscle pain, chills, fever, nausea
 - Some people don't have any side effects and that is ok too.
- 03** Your child will be considered fully vaccinated 2 weeks after their second dose in a 2-dose series.
 - If they are a close contact or are exposed to someone who has COVID-19 they will not need to quarantine or get tested unless they have symptoms.
- 04** Even if your child had COVID in the past, it is still important for them to get vaccinated.
- 05** None of the authorized and recommended COVID-19 vaccines contain the live virus that causes COVID-19. This means that a COVID-19 vaccine cannot make you sick with COVID-19 or make you test positive for COVID-19 after you've been vaccinated.



Información importante sobre las vacunas COVID-19 para padres y tutores

- 01** Si bien la cantidad de niños infectados por el COVID-19 es menor en relación con los adultos, los niños pueden infectarse por el virus que causa el COVID-19, pueden enfermarse a causa del COVID-19 y pueden contagiar el COVID-19 a otras personas. Los CDC recomiendan la vacunación contra el COVID-19 para todas las personas de 12 años de edad o más, para ayudar a protegerlas del COVID-19. **Los niños de 12 años de edad o más pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech.**
- 02** Su hijo/hija puede tener efectos secundarios después de vacunarse, esto es normal y un buen síntoma de que su cuerpo está construyendo protección.
- Efectos secundarios comunes:
 - Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el brazo donde recibió la vacuna
 - Cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre, náuseas
 - Algunas personas no tienen efectos secundarios y esto es normal también
- 03** Su hijo/hija estará considerado vacunado completamente 2 semanas después de su segunda dosis en una serie de 2-dosis.
- Si estuvo en contacto cercano o fue expuesto(a) a alguien con COVID-19 no tendrá que ponerse en cuarentena o hacerse la prueba a menos que tenga síntomas.
- 04** Si su hijo/a ha tenido COVID-19 en el pasado, todavía es importante vacunarse.
- 05** Ninguna de las vacunas autorizadas y recomendadas contienen el virus activo que causa COVID-19. Esto significa que la vacuna COVID-19 no te va a enfermar de COVID-19 o hacer que la prueba sea positiva por COVID-19 después de ser vacunado.
-

